

Bijsluiter bij thyreoidum capsules/tabletten.

Lees ook het informatieblad VI-21 (Medicijnen bij een trage schildklier)

Het gehalte van de schildklierhormonen in de diverse doseringen.

Behorende bij THYREOIDUM chargenr 54171444

caps of tabl	gehalte in mcg per gram thyreoidum mg/caps	T4 (levothyroxine) 586 in microgram	T3 (liothyronine) 134 in microgram	samen doorsnee tablet	T3/T4 720
caps 5	5	2,92	0,69		1/4
tabl 15	15	8,76	2,07	8mm	1/4
tabl 30	30	17,52	4,14	9mm	1/4
caps 50	50	29,2	6,9		1/4
tabl 60	60	35,04	8,28	10mm	1/4
caps 90	90	52,56	12,42		1/4
tabl 120	120	70,08	16,56	11mm	1/4

Het is mogelijk dat uw arts een andere sterkte heeft voorgeschreven. De hoeveelheden T4 en T3 zijn dan overeenkomstig die andere sterkte.

Hoe moeten Thyreoidum capsules/tabletten worden gebruikt ?

De dosering wordt individueel door uw arts vastgesteld. Indien niet anders is aangegeven kan het beste de gehele dosis 's morgens in één keer een half uur vóór het ontbijt worden ingenomen met een ruim glas water.

Hoe moeten de capsules/tabletten bewaard worden ?

Deze kunnen heel goed bij kamertemperatuur bewaard worden. In de oorspronkelijke pot en op een droge plaats (niet op de badkamer of in de keuken). Niet in de koelkast.

Wanneer mag thyreoidum niet gebruikt worden ?

Thyreoidum mag niet worden gebruikt bij thyreotoxicose, acuut hartinfarct, hypogonadisme, nefrotisch syndroom en als vermageringsmedicatie.

Voorzichtigheid is geboden bij oudere patienten of patienten met myxoedeem, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of een gestoorde bijnierfunctie.

Indien u overgevoelig bent voor lactose (melksuiker).

Zwangerschap en borstvoeding.

Tijdens zwangerschap kan thyreoidum worden doorgebruikt. Wel overleggen met uw arts, omdat de dosering kan moeten worden aangepast.

Thyreoidum gaat over in de moedermelk, maar in een zo geringe mate, dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de zuigeling daar nadeel van ondervindt.

Interacties.

Met bepaalde middelen kan thyreoidum een wisselwerking hebben. Overleg hierover met uw apotheker.

De werking van antistollingsmiddelen (acenocoumarol, fenprocoumon) kan worden versterkt. Hernieuwde instelling op geleide van de trombosedienst is geboden.

De opname van thyreoidum kan worden verminderd door colestyramin, colestipol, sucralfaat, ijzerbevattende middelen, antacida en norit.

Het effect van levothyroxine (T4) kan afnemen door Ritonavir.